

Módulo 6 – HIV

① Pais, levem as vossas mulheres para fazerem o teste de HIV para saberem se têm HIV.

- Se tiverem HIV podem iniciar o tratamento antes de ficarem doentes.
- Se você ou a sua mulher tiver HIV, podem tomar medidas para se protegerem um ao outro.

② Se você ou o seu parceiro tiver HIV, usem o preservativo sempre que mantiverem relações sexuais para evitar propagar o HIV.

- O HIV propaga-se mais através das relações sexuais.
- Os preservativos proporcionam uma barreira que impede o HIV de passar dum parceiro para o outro através dos fluidos sexuais.
- Se não conhece o seu estado (ou o estado do seu parceiro) use o preservativo.

③ Pais seronegativos, sejam fieis à um parceiro sexual seronegativo para evitar novas infecções.

- Ser fiel (não ter outros parceiros sexuais) evita futuras infecções.

④ Os pais seronegativos, devem tomar em consideração a circuncisão para evitar novas infecções por HIV.

- A circuncisão reduz as possibilidades de os homens contraírem o HIV durante as relações sexuais.

⑤ Se a vossa mulher for seropositiva, encoragem-na a iniciar o tratamento para evitar passar o HIV ao bebé.

- O HIV pode ser transmitido para o bebé durante a gravidez, parto e amamentação.
- As mães seropositivas devem fazer o tratamento para evitar transmitir o HIV para o bebé.
- Mesmo que a vossa mulher não mostre sinais de doença, encoragem-na a iniciar o tratamento de HIV.


⑥ Se a vossa mulher for seropositiva, ela deve iniciar o tratamento o mais cedo possível.

- Falem com o pessoal da saúde para saber se estão em condições de iniciar com o tratamento.

1




2



3



4



5



6

